

## ワクチン接種時期と抗体有効期間

| 接種後週数                       | 0                                           | 1週            | 2週 | 3週  | 4週 | 5週 | 6週       | 7週 | 8週 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 12ヶ月 | 18ヶ月 | 24ヶ月    |  |       |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------|----|-----|----|----|----------|----|----|-----|-----|------|------|---------|--|-------|
| A型肝炎<br>(エイムゲン)             | 1回目                                         | 2回目           |    |     |    |    | ⇒抗体1年間有効 |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約5年    |  |       |
| A型肝炎<br>(Havrix1440)        |                                             | ⇒1回接種で抗体1年間有効 |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 2回目  |      | ⇒約20年   |  |       |
| B型肝炎<br>(ヘプタバックスⅡ)          |                                             | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約5～10年 |  |       |
| B型肝炎<br>(EngerixB20)        |                                             | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約20年   |  |       |
| A・B混合肝炎<br>(Twinrix)        |                                             | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約20年   |  |       |
| 破傷風                         |                                             | ⇒追加の場合<br>10年 |    | 2回目 |    |    |          |    |    |     |     |      |      | 3回目     |  | ⇒約10年 |
| Tdap<br>(破傷風・ジフテリア・<br>百日咳) | 1回<br>Booster                               | ⇒約10年         |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| DTピック<br>(ジフテリア・破傷風)        |                                             |               |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 狂犬病<br>(VERORAB)            | 1回目                                         | 2回目           |    | 3回目 |    |    | ⇒2年      |    |    |     |     | 追加   |      | ⇒約5年    |  |       |
| 狂犬病<br>(Rabies)             |                                             | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    | 3回目 |     | ⇒約2年 |      |         |  |       |
| 日本脳炎                        |                                             | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約5年    |  |       |
| 腸チフス                        | 1回で<br>終了                                   | ⇒1回接種で抗体3年間有効 |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| ポリオ                         | 1回目                                         | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 髄膜炎菌<br>(MENVEO)            | 1回で<br>終了                                   | ⇒約5年          |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 髄膜炎菌<br>(ナメクトラ)             | 1回で<br>終了                                   | ⇒5年以上         |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| MMR<br>(麻疹・風疹・<br>おたふく)     | 接種歴<br>があれば1回<br>で終了                        | 必要時2回目        |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| MR<br>(麻疹・風疹)               |                                             | ( 必要時2回目 )    |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 麻疹                          |                                             | ( 必要時2回目 )    |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 風疹                          |                                             | ( 必要時2回目 )    |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 流行性耳下腺炎<br>(おたふく)           |                                             | ( 必要時2回目 )    |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 水痘                          |                                             | ( 必要時2回目 )    |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| ダニ脳炎<br>(FSME-IMMUN)        | 1回目                                         | 2回目           |    |     |    |    |          |    |    |     |     | 3回目  |      | ⇒約5年    |  |       |
| インフルエンザ                     | 1回                                          |               |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 経口コレラ                       | 1回目                                         | 2回目           |    |     |    |    | ⇒約2年     |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| マラリア予防薬                     | 流行地域到着2日前から内服開始し、流行地域を離れた後7日間内服 ( 1日1回1錠 )  |               |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |
| 高山病予防薬                      | 高地に到着する前日から到着3日後までの4日間内服 ( 1回 1/2錠を1日2回内服 ) |               |    |     |    |    |          |    |    |     |     |      |      |         |  |       |

ワクチン名 国産

ワクチン名 輸入ワクチン