

ワクチン接種時期と抗体有効期間

接種後週数	0週	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	5ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	24ヶ月
A型肝炎 (エイムゲン)	1回目	2回目		⇒抗体1年間有効		3回目		⇒約5年						
A型肝炎 (Havrix 1440)		⇒1回接種で抗体1年間有効		2回目		⇒約20年								
B型肝炎 (ピームゲン)		2回目		⇒約5~10年										
B型肝炎 (EngerixB20)		2回目		⇒約20年										
A・B混合肝炎 (Twinrix)		2回目		⇒約20年										
破傷風 (破傷風トキソイド「デンカ」)	⇒追加の場合は10年	2回目		3回目		⇒約10年								
Tdap (破傷風・ジフテリア・百日咳)	1回 Booster	⇒約10年												
DTピック (ジフテリア・破傷風)														
狂犬病 (VERORAB・ChiroRab)	1回目	2回目	3回目		⇒2年		追加		⇒約5年					
狂犬病 (ラビピュール)		2回目	3回目		⇒2年		追加							
日本脳炎	2回目		3回目		⇒約5年									
腸チフス	1回で終了	⇒1回接種で抗体3年間有効												
ポリオ (イモバックスポリオ)	1回目	2回目												
接種後週数	0週	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	5ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	24ヶ月
髄膜炎菌 (MENVEO)	1回で終了	⇒約5年												
髄膜炎菌 (メンクアッドフィ)		⇒5年以上												
MMR (麻疹・おたふく・風疹)	接種歴があれば1回で終了	必要時2回目												
MR (麻疹・風疹)		(必要時2回目)												
麻疹		(必要時2回目)												
風疹		(必要時2回目)												
流行性耳下腺炎 (おたふく)		(必要時2回目)												
水痘	(必要時2回目)													
ダニ脳炎 (FSME-IMMUN)	1回目	2回目		3回目		⇒約5年								
インフルエンザ	1回													
経口コレラ (DUKORAL)	1回目	2回目		⇒約2年										
マラリア予防薬 (マラロン配合錠)	流行地域到着2日前から内服開始し、流行地域を離れた後7日間内服 (1日1回1錠)													
高山病予防薬 (ダイアモックス)	高地に到着する前日から到着3日後までの4日間内服 (1回1/2錠を1日2回内服)													
接種後週数	0週	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	5ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	24ヶ月

ワクチン名 国産

ワクチン名 輸入ワクチン