

ワクチン接種時期と抗体有効期間

接種後週数	0	1週	2週	3週	4週	5週	6週	7週	8週	5ヶ月	6ヶ月	12ヶ月	18ヶ月	24ヶ月			
A型肝炎 (エイムゲン)	1回目	2回目					⇒抗体1年間有効					3回目		⇒約5年			
A型肝炎 (Havrix1440)		⇒1回接種で抗体1年間有効										2回目		⇒約20年			
B型肝炎 (ヘプタバックスⅡ)							2回目					3回目		⇒約5～10年			
B型肝炎 (EngerixB20)							2回目					3回目		⇒約20年			
A・B混合肝炎 (Twinrix)							2回目					3回目		⇒約20年			
破傷風		⇒追加の場合10年		2回目										3回目		⇒約10年	
Tdap (破傷風・ジフテリア・百日咳)	1回 Booster	⇒約10年															
DTピック (ジフテリア・破傷風)																	
狂犬病 (VERORAB)	1回目	2回目		3回目			⇒2年					追加		⇒約5年			
狂犬病 (Rabies)					2回目								3回目		⇒約2年		
日本脳炎		2回目										3回目		⇒約5年			
腸チフス	1回で終了	⇒1回接種で抗体3年間有効															
ポリオ	1回目				2回目												
髄膜炎菌 (MENVEO)	1回で終了	⇒約5年															
髄膜炎菌 (メナクトラ)	1回で終了	⇒5年以上															
MMR (麻疹・風疹・おたふく)	接種歴があれば1回で終了	必要時2回目															
MR (麻疹・風疹)		(必要時2回目)															
麻疹		(必要時2回目)															
風疹		(必要時2回目)															
流行性耳下腺炎 (おたふく)		(必要時2回目)															
水痘		(必要時2回目)															
ダニ脳炎 (FSME-IMMUN)	1回目				2回目								3回目		⇒約5年		
インフルエンザ	1回																
経口コレラ	1回目	2回目					⇒約2年										
マラリア予防薬	流行地域到着2日前から内服開始し、流行地域を離れた後7日間内服 (1日1回1錠)																
高山病予防薬	高地に到着する前日から到着3日後までの4日間内服 (1回 1/2錠を1日2回内服)																

ワクチン名 国産

ワクチン名 輸入ワクチン